

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Median saturasi O₂ sebelum mobilisasi progresif level 1 adalah 91% dengan standar deviasi 0,91. Nilai saturasi O₂ terendah adalah 90% dan tertinggi adalah 93% pada pasien penurunan kesadaran Di Ruang ICU RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2023.
2. median saturasi O₂ sesudah mobilisasi progresif level 1 adalah 95 dengan standar deviasi 0,727. Nilai saturasi O₂ terendah adalah 93 dan tertinggi adalah 95 pada pasien penurunan kesadaran Di Ruang ICU RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2023.
3. Median tekanan darah sistolik sebelum mobilisasi progresif level 1 adalah 173 dengan standart deviasi 7,711. Nilai tekanan darah sistolik terendah adalah 160 dan tertinggi adalah 190 dan median tekanan darah diastolik sebelum mobilisasi progresif level 1 adalah 95,50 dengan standart deviasi 3,468. Nilai tekanan darah sistolik terendah adalah 90 dan tertinggi adalah 100 pada pasien penurunan kesadaran Di Ruang ICU RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2023.
4. Median tekanan darah sistolik sesudah mobilisasi progresif level 1 adalah 120 dengan standart deviasi 12,093. Nilai tekanan darah sistolik terendah adalah 110 dan tertinggi adalah 150 dan median tekanan darah sistolik

sesudah mobilisasi progresif level 1 adalah 89,00 dengan standart deviasi 3,633. Nilai tekanan darah sistolik terendah adalah 84 dan tertinggi adalah 95 pada pasien penurunan kesadaran Di Ruang ICU RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2023.

5. Terdapat pengaruh saturasi O₂ sebelum sesudah Mobilisasi Progresif Level 1 pada pasien penurunan kesadaran Di Ruang ICU RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2023. P=0,000
6. Terdapat pengaruh tekanan darah sebelum sesudah mobilisasi Progresif Level 1 pada pasien penurunan kesadaran Di Ruang ICU RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2023. P=0,000

B. Saran

1. Kepada Pimpinan RSUD dr. Rasidin Padang

Disarankan kepada pimpinan RSUD dr. Rasidin Padang untuk mempertimbangkan pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 pada pasien yang mengalami tekanan darah dan saturasi oksigen yang tidak stabil di Ruang ICU.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh intervensi mobilisasi progresif level 1 terdapat kejadian luka *decubitus* pasien.